



Οίστρος & στείρωση

Η άνοιξη έρχεται, τα πουλάκια κελαηδούν, οι μελισσούλες ζουζουνίζουν και... η γάτα σας είναι σε οίστρο! Πως θα αναγνωρίσετε τα σημάδια; Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία και στιγμή για στείρωση; Απαντήσεις σε όλες τις απορίες σας παρακάτω!

της **B. MEINTANH** ελληνικός όμιλος γάτας

O οίστρος της γάτας ξεκινά στην εφηβεία της και διαφέρει ανάλογα με τη φυλή, το σωματικό μέγεθος και τη γεωγραφική περιοχή. Κάποιες γάτες μπορεί να ξεκινήσουν να έχουν οίστρους από την ηλικία των τεσσάρων μηνών, ενώ κάποιες άλλες μετά την ηλικία των δέκα μηνών.

Αν και οι περισσότερες γάτες που ζουν στο αστικό περιβάλλον ζευγαρώνουν πολλές φορές το χρόνο, οι τυπικές περίοδοι αναπαραγωγής είναι οι πρώτες εβδομάδες της άνοιξης και αυτές του φθινοπώρου, που οι μέρες αρχίζουν να μεγαλώνουν σε διάρκεια.

Συμπτώματα...

Όταν μια γάτα έρχεται σε οίστρο μπορεί να γίνει ασυνήθιστα εκδηλωτική και τρυφερή με τους ανθρώπους και τις άλλες γάτες. Πολύ συχνά "κάνει βαρελάκια" στο πάτωμα, κι όταν τη χαϊδεύουμε ανασκώνει το πίσω μέρος του σώματός της. Οι περισσότερες γίνονται πολύ πιο ομιλητικές, και νιαουρίζουν επίμονα με το χαρακτηριστικό νιαούρισμα που θυμίζει κλάμα

μωρού. Κάποιες ασχολούνται ιδιαίτερα με την υγειεινή της ευαίσθητης περιοχής τους, δεν έχουν ιδιαίτερη όρεξη για φαγητό, και μερικές μαρκάρουν την περιοχή τους, ιδιαίτερα σε κάθετες επιφάνειες.

Υπάρχουν και σπάνιες περιπτώσεις γατών που παρότι βρίσκονται σε οίστρο δεν εμφανίζουν κανένα από τα παραπάνω σημάδια, κι έχουν αυτό που αποκαλούμε "σιωπηλό οίστρο".

Ο οίστρος μπορεί να κρατήσει από 5 έως 10 μέρες. Αν η γάτα δε μείνει έγκυος ή στειρωθεί, θα ξαναέρχεται σε οίστρο ανά δύο ή τρεις εβδομάδες, μέχρι να μείνει έγκυος ή να τελειώσει η περίοδος αναπαραγωγής.

Αν η γάτα σας βρίσκεται σε οίστρο, κρατήστε τη μέσα στο σπίτι, προσέχοντας ιδιαίτερα μπαλκόνια, πόρτες και παράθυρα, καθώς θα προσπαθήσει να βρει με κάθε τρόπο ταίρι για να ζευγαρώσει.

Με τη στείρωση η γάτα σας δε θα ταλαιπωρείται από τους συνεχείς οίστρους, δε θα φέρει γατάκια σε έναν κόσμο όπου ήδη υπάρχει υπερπληθυσμός αδέσποτων, δε θα κινδυνεύει να μολυνθεί από λοιμώ-

δη νοσήματα που μεταδίδονται με τα ζευγαρώματα και θα απαλλαγεί από τον κίνδυνο εμφάνισης όγκων που σχετίζονται με τις ορμόνες του οίστρου.

Η διαδικασία

Σεότι αφορά τους γάτους, με τη στείρωση, εκτός της εξάλειψης του κινδύνου περιπλάνησης για αναζήτηση θηλυκού και καυγάδων με άλλα αρσενικά με ότι αυτό συνεπάγεται, σταματά και το μαρκάρισμα της περιοχής, με τη χαρακτηριστική δυσσομία που αυτό επιφέρει.

Οι γάτες συνήθως στειρώνονται σε ηλικία μεταξύ 5 και 9 μηνών, αν όμως το βάρος τους το επιτρέπει, μπορεί να στειρωθούν ακόμη και δύο μηνών με ασφάλεια. Κάποιοι κτηνίατροι υποστηρίζουν μάλιστα, ότι όσο νωρίτερα στειρωθεί το ζώο, τόσο πιο εύκολη είναι η διαδικασία ανάρρωσης.

Η στείρωση είναι πλέον μια επέμβαση ρουτίνας και είναι μια σχετικά ασφαλής διαδικασία, κρατώντας βέβαια στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι δεν παύει να είναι μια επέμβαση.

Μετά την επέμβαση χορηγούνται αντιβιοτικά και κάποιες γάτες φορούν το ειδικό κολάρο για να μην γλύψουν την τομή ή τραβήξουν τα ράμματα. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα την κλινική, τη νάρκωση

(με αέριο, με πιο οικονομικό ή πιο ακριβό αναισθητικό), την ίδια την επέμβαση (με απορροφήσιμα ή μη ράμματα), και τον τύπο της αντιβίωσης (χάπι από το στόμα που χοργεί ο ιδιοκτήτης τις επόμενες μέρες, ενέσιμη αντιβίωση μακράς διαρκείας κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση είναι μια επέμβαση που θα γλιτώσει και εσάς και το ζώο σας από πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις όσον αφορά την υγεία και τη συμπεριφορά.

Η γέννα

Είναι μύθος ότι μια γάτα πρέπει να έχει περάσει τον πρώτο της οίστρο ή ακόμη και να έχει κάνει τουλάχιστον μια γέννα πριν στειρωθεί. Επίσης, μύθος είναι ότι η γάτα σας θα παχύνει και θα γίνει τεμπέλα λόγω της στείρωσης. Οι γάτες όντως μετά τη στείρωση λόγω επιπέδου ορμονών αλλά και λόγω ηλικίας, δεν έχουν τη δραστηριότητα που είχαν ως γατάκια ή αυτή που έχουν οι γάτες που αναζητούν συνεχώς ταΐρι και γεννούν. Αν η γάτα σας αρχίσει να ξεπερνά το βάρος που αναλογεί στο σωματότυπό της, μπορείτε να ρυθμίσετε τη διατροφή αλλά και τη σωματική της δραστηριότητα ανάλογα, παίζοντας μαζί της περισσότερο και ταΐζοντάς της μια τροφή με χαμηλότερες θερμίδες.